

## ¿SABRÍAS RECONOCERLA?

### Lesiones Hurley I



Lesión de HS, estadio Hurley I  
zona mamaria

### Lesiones Hurley II



Lesión de HS, estadio Hurley II  
zona axilar

### Lesiones Hurley III



Lesión de HS, estadio Hurley III  
zona perianal

El sistema de estadiaje más utilizado en la clínica es el **HURLEY:**

#### Estadio Hurley I

Formación de abscesos, únicos o múltiples sin tracto sinusal ni cicatrices

#### Estadio Hurley II

Abscesos recurrentes con formación de tractos fistulosos y cicatrices, únicas o múltiples lesiones separadas ampliamente

#### Estadio Hurley III

Múltiples abscesos y múltiples tractos fistulosos y cicatrices

Hidradenitis - Código de tipificación CIE: 705.83

Fuente: Iniciativa Estratégica de salud para la definición del Estándar Óptimo de Cuidados para los pacientes con Hidradenitis Suppurativa (Junio 2017).

**9** AÑOS  
MEDIA PARA  
DIAGNÓSTICO

**14,6** MÉDICOS  
MEDIA DE MÉDICOS  
VISITADOS HASTA  
EL DIAGNÓSTICO

**6** CIRUGÍAS  
DE MEDIA

**87,4%**  
AFIRMA QUE LA HS  
AFECTA A SU VIDA  
DIARIA

**35** DÍAS  
DE BAJA LABORAL  
MEDIA

**72,4%**  
POCO O NADA  
SATISFECHOS CON  
LA ASISTENCIA  
SANITARIA RECIBIDA

Link al documento **Hércules**:

<https://www.semng.es/index.php/noticias-semng/item/134-publicada-la-iniciativa-estrategica-de-salud-para-la-definicion-del-estandar-optimo-de-cuidados-para-los-pacientes-con-hidradenitis-suppurativa>

Iniciativa Estratégica de salud para la definición del Estándar Óptimo de Cuidados para los pacientes con Hidradenitis Suppurativa (Junio 2017).

HAGAMOS  
VISIBLE  
LO INVISIBLE

## GUÍA PARA EL MANEJO DE LA HIDRADENITIS SUPURATIVA EN LOS SERVICIOS DE AP

## ¿QUÉ ES LA HIDRADENITIS SUPURATIVA?

• La **Hidradenitis Suppurativa (HS)** es una enfermedad **inflamatoria crónica**, de inicio a partir de la pubertad, más frecuente en mujeres. Clínicamente se caracteriza por nódulos inflamatorios en zonas intertriginosas, que pueden drenar espontáneamente un material maloliente y confluír en la dermis profunda, formando extensas áreas inflamatorias que cursan con cicatrices.

Este conjunto de signos y síntomas produce un **deterioro importante de la calidad de vida** de los pacientes.



Nódulo inflamatorio.



Cicatrices y fistulas.

Fuente: Iniciativa Estratégica de salud para la definición del Estándar Óptimo de Cuidados para los pacientes con Hidradenitis Suppurativa (Junio 2017).

## CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA HS

- **El tipo de lesiones cutáneas que presenta el paciente:** Nódulos, fístulas y abscesos.
- **La localización:** Principalmente en axilas, ingles, glúteos y las áreas perianal, mamaria e inframamaria. También en la nuca y zona retroauricular.
- **La recurrencia:** Dos o más brotes en los últimos seis meses es la recurrencia que se considera como sospecha clara de HS.

### Algoritmo diagnóstico de la HS



\*Otros Indicadores que ayudan al diagnóstico de la Hidradenitis Supurativa:

- Antecedentes familiares de HS
- Ausencia de fiebre
- Ausencia de adenopatías

## OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN LA HS


Los objetivos de la Atención Primaria en relación con la HS deben ser:

- Objetivos de diagnóstico de la HS**
- Establecer un tratamiento personalizado y un seguimiento de los pacientes favoreciendo la toma de medidas preventivas.
  - Abordaje tanto de las enfermedades asociadas como de las complicaciones propias de la HS.
- Colaborar con la detección precoz.
  - Realizar el manejo clínico valorando el grado de severidad.


Fuente: Iniciativa Estratégica de salud para la definición del Estándar Óptimo de Cuidados para los pacientes con Hidradenitis Supurativa (Junio 2017).

## MANEJO CLÍNICO Y SEGUIMIENTO HURLEY I

### HURLEY I: Presencia lesiones nodulares




### HURLEY I: Presencia abscesos



\*Manejo del dolor según escala analgésica de la OMS.  
\*\*Según cartera de servicio específica de enfermería.

## MANEJO CLÍNICO Y SEGUIMIENTO HURLEY II

### HURLEY II: Presencia abscesos




### HURLEY II: Predominio de fístulas



\*Manejo del dolor según escala analgésica de la OMS.  
\*\*Según cartera de servicio específica de enfermería.

## MANEJO CLÍNICO Y SEGUIMIENTO HURLEY III

### HURLEY III



Fuente: Iniciativa Estratégica de salud para la definición del Estándar Óptimo de Cuidados para los pacientes con Hidradenitis Supurativa (Junio 2017).

\*Manejo del dolor según escala analgésica de la OMS.  
\*\*Según cartera de servicio específica de enfermería.